









Lib. K. contenant ce livre vixhuit feuilles de toutes sortes de figures.

I

Inhalt 121 Bl.

244 abb.



ÆLATINH quibusdam.

HEDERA TERRESTRIS & CORONA TERRÆ vulg.

Gall. Eidenkraut.

germ. Eidenkraut und Eidenkraut.

Ælg. Eidenkraut, &c.

Flambric, Dierpfluy den der fagge.



Nascitur pœssim in sepius ac locis umbratis.  
Floret ab Aprilis mense per totam fere æstatem, Gerbat, et  
folia per totum annum plerumq; vivunt.



ἈΜΠΕΛΟΣ ΟἶΝΟΦΟΡΟΣ ἢ ἈΜΠΕΛΟΣ ἸΜΕΡΟΣ

VITIS VINIFERA

Ital. Vite domestica.

Gall. vigne

Germ. Weinrebe.

Belg. wyngaert



Climosis & apricis locis gaudet.

Floret nobis mense junio.



*Brionia vitis alba*

3

3







*Arisaema*

Collet. fol. 746.

ent. mentum facit sine figura Dalech. Pl. 13 fol. 1412











LUPULUS salvestris

6



Tab 13 fol. 141. vbi de descriptione de galieno libro

8  
141



BPYON

LUPULUS seu LUPUS SALICTARIS

Ital. Lupolo seu Brusandola.

Gall. Soubloy

Germ. Hopfen

Belg. Goppw



Nascitur fere ubiq; in sepib. Scitur tamen à  
Germanis Septentrionalib; et à nobis, ac vitis instar  
studiosè colitur ad condiendam cerensiam.

Globosi ac squamosi eius flores mense Augusto pro  
ueniunt, in quibus semen Septembri mense ma  
turefeit.



ΚΙΣΣΟΣ  
HEDERA

Ital. Hedera.  
Gall. Eparuv. Licere.  
Germ. Effen oder Epping.  
Belg. yuffer.

Porrò hec arborea est, seu  
NIGRA Dioscoridis.

Diosc. lib. 2. cap. 172.  
Galen. lib. 7. Simp. medic.



Nasitur passim temere, scanditq. non modo arbores:  
sed et parietes ac tecta.  
Floret estate, sed bacce, cyma maturescunt.



*Gall. Lierre*



*Hedera helix* 16. 13. 1919

*Hed. fol 731*






Lib. 13. 1722

Figura Sec Smilax smilaci aspera albesc. vide Libell. fol. 737



*Clematis betica* clusii, lb 13 fol 131

10



lb 13 fol 1422

*Smilax aspera*

aloe fol 736

10



fol. 980. Aristolochia Clematitis altera hispida tabell. fol. 723.





Gall. Liseron






ΕΛΞΙΝΗ ΚΙΣΣΑΜΠΕΛΟΣ  
**MELXINE CISSAMPELOS**, Dodonae.  
CONVOLVULVS, quibusdam.  
VITEALIS alijs.

Germ. Szwart. Vinder vnd Mittelvinder.  
belg. Szwarte Vinder & middelvinder.

Disq. lib. 4. cap. 31.




Nascitur in sepibus, vinctis &  
segetibus.

Floret mense Julio, semineq; perficit Augu-  
sto, & paulo post emoritur.

Ab. 13. fol. 1424



*Gall. petit liseron*





*Laurus tinus*

26. 2. fol. 204  
14



*periclymenum perfoliatum* Lib. 13. fol. 1427.







ΠΕΡΙΚΛΥΜΕΝΟΝ  
PERICLYMENVM VVLGARE seu PRIMVM &  
VOLVCERV MAIVS

Ital. Vini bosco, Matriselua &  
Caprifoglio.  
Gall. Cē dūrvuēil.  
Germ. Genszblatt, zūgēng und  
Waldfūgēng.  
Belg. Worsbūde, Camferbūde, zūgēng  
Mammūfūtus frūkt.

Diosc. lib. 4. cap. 12.  
Galen. lib. 8. Simp. medic.



Nascitur passim in sepibus, dumetis ac silvis, proximis  
quibusq; seu arboribus seu fruticibus seorsim adulescens.  
Floret Junio Julioq; mensibus: baccasq; maturat  
Septembri.





Lib. 2. 273. periclymenum Dodon.







*Gall. Jasmin*





CLEMATIDIS ALTERIVS ALTERA SPECIES,  
*Floris caruleo.*



Nobis peregrina est planta : sed Anglis seu  
 Britannis familiaris, quibus inter Anemeta  
 ac sepes abunde nascitur.

Floret in fine aestatis.




*L<sup>re</sup> 14. L. contenant ce livre quatre feuilles la pluspart essant choses des indas*

*19*



NVX INDICA.

De qua Val. Cordus plantar. historie  
libr. 4. cap. 14.



Fauſel cum ſuo muolacro  
capillaceo.



Fauſel, ſive Auellana Indica  
utrinque expreſſa.



Mehenbethe Cortusi.  
Amic. lib. 2. Canon. cap. 481.



Auellanae indicae genus.



Nucis genus indicum.



Eadem non triquetra.

Nux ex Pennon de  
Velez allata. 1564.



GLANS vnguentaria, ſive BEN officinar.  
que videtur Myrobalanus Bellivicus  
Aginolphi.




Nux vomica officinarum.

integra. aperta.



CAIOVS Breſilianorum, de quibus  
Theuetus cap. 61. Descriptionis Americæ.

Cajous per medium ſectus.



Cajous nuclei.

alter ſine tunica. alter cum tunica.





O F F I C I N A R I U M

*Santalum pallidum,*  
*idq. odoratum.*



*Santalum album,*  
*utrinque odoratum.*



*Santalum rubrum,*  
*moderum.*



*Narcaphthum*  
*Thymiana officinarum.*



*Thymiamatis officinarum fructus forte.*





*Agallochum verum.*






CVBEBE officinarum



FOLIVM officinarum, male Sactens  
pro MALABATHRO exhibitum.

De quo vide Val. Cordum plantar. Histor. lib. 4. cap. 52.  
Imo D. Carcæ ab Horto legitimum Malabathrum est,  
etiamnum Indis, apud quos frequens, Tanalapatra nuncupatur.



Fragaria Anicenna.



Malabathri fructus.





ROSA HIERICHVNTIS

& clausa & aperta,



malè ab aliquibus pro  
AMOMO  
Galectemio Sabita.



Aperitur vero non statim tantum noctis Nata  
litiæ Solis, nec sua sponte, sicuti credulo mulier,  
culorum vulgo persuasum aliquando fuit: sed  
quandocumq; & quocumq; volueris, tibi eam  
aqua aut vino ante maceraveris.







5

Canella legitima  
Cinnamomum officinarum



Canellae folium.



Canella ignobilioris tria genera, quae Belgicae quaedam officinae pro Cassia utuntur, ligneamq. cognominant.



Cinnamomum rupestris cum suo ligno.





CASSIAE SOLUTIVAE  
*trium diversarum specierum  
 silique fistulares sicce,  
 sicuti ad nostros pharmacopolas perferuntur.*



CARPOBALSAMVM officinarum



PIPER AETHIOPICVM *Mattbioli*, SICCVM



*piper longum.*



*Cosinus amarus Cortus.*



*Cosinus Lusitanicus odore violaceo.  
Idem forte quem cum eo querit. D. Carcius describit.*



*Costi italici semen Cortus.*



*Zedoaria rotunda.  
Zerumbet Serapiomis.  
Blarkz. Voad aromatizis.*



*Zedoaria Matthiae lobel  
Costus venetis.*

*Costus officinarum*



*Zedoaria officinarum.*



*Zedoariae officinarum gannus aliud.*



Al. 18. f. 1617.



*Iuncus odoratus.**Aspalathus Disgl.*

*Leonum Rhodium quibusdam ab odore rosarum.*



*Leonum Rhodium, quod à Rhodo insula fit.*  
*Xylaceae officinarum.*





Huius ut videtur iconem  
exprimit Thevetus cap. 10  
Descriptioni America.



Pulpa cum semine fructus  
hic expressi.





Fructus Hygneri hb. 18. fol. 1844.



5


Fructus Hygneri hb. 18. fol. 1844.







STYRACIS RAMVS CVM SVO  
fructu.







petum

TABACO Hispanis

Indis petum

Latinis. Saba sancta: et Herba sancta

Gallis. NICOTIANA. Tabac de virginie, ou du Brasil

Clusio. PETVM.

Dodoneo. Hyoscyamus Peruvianus.







HERBA SANCTA flore luteo.  
HYOSCYAMUS LVTEVS Dodonæo.  
PRIAPEA vulgò.

Gall. ~~Isotum~~ jaubert.



Seritur nobis in Cortis.  
Floret mense Iulio Augustoque.





*Phaseolus bresiliensis* hb. 18. fol. 1904.



Phasioli genus indicum,  
à Coldenbergo acceptum.



Phasioli gns. Vlyssipore allatum,  
idem forte cum ea faba quam Thevetus  
cap. 38. Descript. Americæ.





BATTATA *clv*  
LATIFOLIA



Huius Serbe radicibus Indi, non modò crudis absq. et elixis vulgo  
vescuntur: sed et in puluerem comminutis ac in massas redactis,  
Loco panis vtuntur.



*L. M. contenant ce livre quatre vingt et huit feuilles de toutes sortes de planis* 73



i

Sparganium angustifolium Michx. pag. 123. t. 204. 1.

Pl. 2.

Sparganium angustifolium Michx. pag. 123. t. 204. 1.

Sparganium angustifolium Michx. pag. 123. t. 204. 1.

Sparganium angustifolium Michx. pag. 123. t. 204. 1.

1

m



TRITICVM TYPHINVM  
alterum hirsutius.

Bis



Seritur utrumq; pascim in Belgico,  
& interdum Tritico permixtum mactitur.

.Andae gr. f. 128

Dod. 4. l. 2.

2







ΠΥΡΟΣ  
TRITICVM


Ital. Grano  
Gall. Froment.  
Cerm. Weizen  
Belg. Triticum

Dief. lib. 2. cap. 77.  
Galen. lib. 8. simp. med.  
C. lib. 1. de alim. facult.

TRITICVM  
*hirsutum.*

VSTILAGO  
*Tritici*

13.



Triticum hirsutum L. 378  
Triticum L. 27

Sp. 418 in genere

et in lib. 1. de alim. facult. lib. 2. cap. 77.

3





MAIZI  
spica rubra .

. Hort. Turc. f. 51  
p. 382. sine nomine



MAIZI  
spica flava .

. Hort. Turc. f. 51  
p. 382. sine nomine



5



Anders Jonsson great artist 1710-1712



MAIZVM  
 vulgo FRUMENTVM TYRCICVM, seu  
 ASIATICVM  
 TRITICVM BACTRIANVM, Val. Cordo.

Gall. Weizen Korn  
 Germ. Weizen Korn  
 Belg. Weizen rozen

Indis Turcis familiare est, nobis in Hortis colitur,  
 satumq; mense Aprilis, maturat Augusto.







*Calamagrostis Canadensis* Michx.

Ed. 4. fol. 382.







*Frumentum saracenicum*

ΦΗΓΟΠΥΡΟΝ

FAGOTRITICVM &

TRAGOPYRON Dodoneo.

FRUMENTVM TURCICVM Matthiolo.

Germ. Sigdy korn

belg. Wou-wyrt.

Gall. Blé noir, Sarrazin



Macro tenuiq; solo gaudet, quamvis &  
laetum non abhorreat.  
Scribitur à medio vere deinceps, per totam ferè estatem:  
maturescitq; octava aut nona post sationem  
sebdomadè.

*Frumentum Saracenicum* P. 383  
Boissier f. par. 2. pag. 73





Fig. 1



GRA MEN  
ALOPE CVROIDES

1. Germ. & A. p. 10. 1. p. 10. 1. p. 10.




.N. 10. 1. p. 10.

.N. 10. 1. p. 10.

.N. 10. 1. p. 10.





*Briza odorata* L. 395

*Briza odorata* L. 395





~~S. Peters coorne.~~

no. 8046 lib. 4. pag. 396

.Borale G. 396



*Vilago*  
Brant.

*Vilago animum f. 45*  
S. 418. de Sui Vilagino

*Avena*  
Hauert.

26 4. f. 403

*Avena f. 403*





KPIΘH  
HORDEVN

Italis orzo  
Call. orge.  
Ger. gersten  
Belg. gerst

Hordeum distichon  
Call. Petit orge.  
Ger. Futhgerst  
Belg. Klein gerst

Columella  
Calatium id  
appellat.



Invenitur hoc  
plerumque  
Easius permissum.

Hordeum distichon p. 398

Hordeum Easius  
Call. Gros orge: & nomulus Sacour  
Ger. Gros gerst  
Belg. Dombeygerst: si antehyem seratur: at si Martio  
Sompgerst: si idem appellatur.

Columel. Cantherium.



Aerugo sine  
Rugido.

Seritur hoc interdum  
sub hyemem, sed frequen-  
tius Martio & Aprili.

Hordeum p. 399

Hordeum p. 399

Hordeum p. 399





*Regiopsis Codon. 5906*

*Polyp. 40. 41*

*Lucina 40. 41*

*Regiopsis Codon. 5906. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.*

*Polyp. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.*





*Bromus, setula L.* Rb. 4. fol. 405

*Bromus setula L.* Rb. 4. fol. 405

*Lobell. fol. 41.*



*Milium Indicum* Dod.  
Gall., graind Millet



*Milium Indicum* F. 410  
Gerssuet F. 52



Hae descriptiones continentur in libro Milii  
auctoris illi adscripta est. Linn.

MILIVM NIGRVM

Quod an MILIVM INDICVM Pliny sit, cuius  
meminit lib. 16. cap. 7. non satis auis affirmare:  
Quum nec amplitudo grani, nec arundineus culmus,  
nec frugis fertilitas satis respondeant: sed grani  
tantummodò nigredo aliquantulum conveniat. Alius  
à vulgari parum differt.

Mattiolus interim SORGI sen MELEGAM  
Italorum: podonque vero MAIZVM Indico-  
rum, pro MILIO INDICO exhibent.



Milium nigrum 5. 409  
Hort. F. 50

Milium v. videtur nostras f. 409. 4.





Phymisetos f. 8

264

Phymisetos gras.  
Lobell fol. 8.





• Vredtgras of foudgras mit sifconigzer vüchtgeffrude nach f. 5

Gramen sagetale pumula speciosa Lobellii pag. 5. part. 1.



Hae descriptiones continentur in libro Milii  
auctoris illi adscripta est. Linn.

MILIVM NIGRVM

Quod an MILIVM INDICVM Pliny sit, cuius  
meminit lib. 16. cap. 7. non satis a se affirmare:  
Quum nec amplitudo grani, nec arundineus culmus,  
nec frugis fertilitas satis respondeant: sed grani  
tantummodo nigredo aliquantulum conveniat. Alius  
a vulgari parum differt.

Mattiolus interim SORGI sen MELEGAM  
Italorum: podonque vero MAIZVM Indico-  
rum, pro MILIO INDICO exhibent.



Milium nigrum 409  
Hort. F. 50

Milium nigrum videtur nostras fere 409. f. 4.



ΚΕΙΧΡΟΣ  
Ital. Miglio.  
Germ. Siro

MILIVM  
Gall. millet  
Belg. melir.

Torrò duorum est generum: quodam sic  
representatur, quia candidius altero est,  
MILIVM ALBVM appellamus.

Diosc. lib. 2. cap. 89.  
Galen. lib. 7. simp. medic.



Palustribus praequibusq; locis feri gaudet.  
Seriatur autem vere, maturescitq; aestate,  
et perdurat in multos annos, modo aservetur  
locis à vento non perflatis.

Milium nigricans L. f. 50. f. 51. f. 52.

Et 4. f. 409.

Bot. icon. Milium nigricans L. f. 50. f. 51. f. 52.



114

17



Forb. Gracile, runcin. ligulae, p. 21. p. 11.

*Fig. 1. 21. p. 21. p. 11.*

264

16



Hoc agrippa commentum Lincolni Milio  
 auct. nob. illi adscripta est. hanc.

MILIVM NIGRVM

Quod an MILIVM INDICVM Plinij sit, cuius  
 meminit lib. 18. cap. 7. non satis amsim affirmare:  
 Quam nec amplitudo grani, nec arundineus culmus,  
 nec frugis fertilitas satis respondeant: sed grani  
 tantummodo nigredo aliquantulum conveniat. Alias  
 à vulgari parum differt.

Mattiolus interim SORGI sen. MLEGAM  
 Italicum: Podongus vero MAIZVM Indico-  
 rum, pro MILIO INDICO exhibent.



Milium nigrum F. 409  
 Hinc F. 50

milium v. videtur nostras fide 409. F. 40



ΠΑΥΜΟΣ Diosc. &  
 ΜΕΛΙΝΟΣ Theophrasti, Dodoneo.  
 PANICVM

Ital. Panic.  
 Gall. Panic. ou panis  
 Germ. Isenmil, & Heydelppanie.  
 Belg. Panickhoorn.

Diosc. lib. 2. cap. 90.  
 Galen. lib. 6. simp. medic.



Puluerulentum & subtilissime subacto solo delectatur:  
 sed nec sabulosa respuit.  
 Scribitur autem tempore verno, quadragesimoq; inde die,  
 in calidis regionib. metitur. Apud nos vero, mense  
 Aprili satum, in tunis maturescit.

Lib. 4. f. 412

Panicum sativum p. 412





Panicum spretum L. f. 19

Panicum spretum L. f. 15

*Panicum spretum*  
Panic Grass

As. panicum L. f. 19. Panicum spretum L. f. 19. 1813.

Grasses of the Panicum spretum L. f. 19. 1813.

Grasses of the Panicum spretum L. f. 19. 1813.



panch. fl.



Anders grad gelystende kornet på spærstjævet f. 10

17. Grannig gærulchi Zabimauantai.

Anders. f. 10



ΦΑΛΑΡΙΣ  
PHALARIS

20.  
Belg. Sparrezaart, off  
Zart van Canarij

Disse. lib. 3. cap. 136.  
Elin. lib. 27. cap. 12.  
Gal. lib. 8. simp. med.



Hispaniis atq. insulis Fortunatis familiaris  
seges est: Sic à rei herbariæ studiosis  
tantummodo colitur.

Semen mense julio atq. Augusto maturæcit.

Phalaris F. 415

20. 4. f. 2. 415.





*Polium* F. 417  
L. 44

*Polium* F. 417  
L. 44



ΦΟΙΝΙΞ  
PHOENIX

LOLIVM MYRINVM, quibus  
LOLIVM RUBRVM alijs.  
Ital. Giglio salvatico.  
Flandr. Zwat.

Diosc. lib. 4. cap. 55.

GRAMEN PHALA  
RI CVM  
à Phala ris similitu  
dine sic  
nobis appellatur.

GRAMEN BARBATVM  
Flandr. Gase

GRAMEN  
ROIDES

ALOPECV  
ALTERVM

GRAMEN  
AEGILOPI SIMILE

Fland. Dordyn, Druanika



Nasitur in arvis tectisq. recentior illis  
ac iuxta vias.

Nasuntur in arvis ac fratis iuxtaq.  
vias.

5. de Bromo Phalaride foliis p. 42. p. 43. p. 44. p. 45. p. 46. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 52. p. 53. p. 54. p. 55. p. 56. p. 57. p. 58. p. 59. p. 60. p. 61. p. 62. p. 63. p. 64. p. 65. p. 66. p. 67. p. 68. p. 69. p. 70. p. 71. p. 72. p. 73. p. 74. p. 75. p. 76. p. 77. p. 78. p. 79. p. 80. p. 81. p. 82. p. 83. p. 84. p. 85. p. 86. p. 87. p. 88. p. 89. p. 90. p. 91. p. 92. p. 93. p. 94. p. 95. p. 96. p. 97. p. 98. p. 99. p. 100.

4. Gramen Phalaridis foliis p. 42. p. 43. p. 44. p. 45. p. 46. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 52. p. 53. p. 54. p. 55. p. 56. p. 57. p. 58. p. 59. p. 60. p. 61. p. 62. p. 63. p. 64. p. 65. p. 66. p. 67. p. 68. p. 69. p. 70. p. 71. p. 72. p. 73. p. 74. p. 75. p. 76. p. 77. p. 78. p. 79. p. 80. p. 81. p. 82. p. 83. p. 84. p. 85. p. 86. p. 87. p. 88. p. 89. p. 90. p. 91. p. 92. p. 93. p. 94. p. 95. p. 96. p. 97. p. 98. p. 99. p. 100.

3. Gramen barbatum foliis p. 42. p. 43. p. 44. p. 45. p. 46. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 52. p. 53. p. 54. p. 55. p. 56. p. 57. p. 58. p. 59. p. 60. p. 61. p. 62. p. 63. p. 64. p. 65. p. 66. p. 67. p. 68. p. 69. p. 70. p. 71. p. 72. p. 73. p. 74. p. 75. p. 76. p. 77. p. 78. p. 79. p. 80. p. 81. p. 82. p. 83. p. 84. p. 85. p. 86. p. 87. p. 88. p. 89. p. 90. p. 91. p. 92. p. 93. p. 94. p. 95. p. 96. p. 97. p. 98. p. 99. p. 100.

2. Gramen phalaricum foliis p. 42. p. 43. p. 44. p. 45. p. 46. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 52. p. 53. p. 54. p. 55. p. 56. p. 57. p. 58. p. 59. p. 60. p. 61. p. 62. p. 63. p. 64. p. 65. p. 66. p. 67. p. 68. p. 69. p. 70. p. 71. p. 72. p. 73. p. 74. p. 75. p. 76. p. 77. p. 78. p. 79. p. 80. p. 81. p. 82. p. 83. p. 84. p. 85. p. 86. p. 87. p. 88. p. 89. p. 90. p. 91. p. 92. p. 93. p. 94. p. 95. p. 96. p. 97. p. 98. p. 99. p. 100.

1. Lolium myrinum foliis p. 42. p. 43. p. 44. p. 45. p. 46. p. 47. p. 48. p. 49. p. 50. p. 51. p. 52. p. 53. p. 54. p. 55. p. 56. p. 57. p. 58. p. 59. p. 60. p. 61. p. 62. p. 63. p. 64. p. 65. p. 66. p. 67. p. 68. p. 69. p. 70. p. 71. p. 72. p. 73. p. 74. p. 75. p. 76. p. 77. p. 78. p. 79. p. 80. p. 81. p. 82. p. 83. p. 84. p. 85. p. 86. p. 87. p. 88. p. 89. p. 90. p. 91. p. 92. p. 93. p. 94. p. 95. p. 96. p. 97. p. 98. p. 99. p. 100.



TRITICVM VACCINVM.  
sen BOVINVM, Dodonæo.

Germ. kumbyssen.  
Belg. kumbyssen.



Tritico nascitur, lœtis potissimum  
locis.

Floret mense junio &  
quandoq; julio.

Triticum Vaccinum G. 419  
Pav. & Boiss. f. 47



CRISTA GALLINACEA LVTEA MINOR



Vasitur inter segetes ac iuxta vias.  
Floret mense junio julioq.



GRAMEN CRATAEO GONVM, Dodonæo.

Germ. Augen trostgras.  
Belg. Soggentrostgras



Nascitur passim in dumetis ac  
sentietis  
Floret mense April.









10. Gramen japonicum. foliis. pag. 96.

foliis. pag. 97. fig. 2. p. 11.



GRAMEN  
GRAMEN

STRIATVM seu  
ANGLICANVM

Ital. Stringa di  
Gall. Agnelletto  
Belg. Ghoskrypt

Napoli.  
Varmos.  
gland

GRAMEN, radice bulbosa.

Belg. Bolluggore off knoppgewas.

Floret utrumq. a mense Junio, per totam  
ferè estatem.

Scritur nobis in Hortis  
latissime propagat

ubi se

Nascitur passim in arvis & pratis  
edicturibus.





V. Gramin. aëthrae. Tabernaemontani





*Galium asperum* Calyc. 2 lob. 2  
Lob. 4. 1840 438





Ag. graminis minimi Karstom. in quod Lib. 4. p. 433. et in fœder. pag. 5. part. 1.

a. Gramen minus Colobus fol. 4.

Gramen pratense Colobus fol. 4.

Lib. 4. pag. 422. et part. 2.





AEGILOPS Plinij, Trago.

Gall. Amourvotte.

Germ. Safen brot, Aeginoletto.

Belg. Zouwenilleu seu Zouwen  
minu, id est GRAMEN TRE

MVLVM.

GRAMEN MILIARE

Flandr.

Zantysse.



GRAMEN  
CANARIA

SORGIATVM

Plinij, quibusdam.



Ineris nostratib.  
Pyrgos.

Plin. lib. xxv. cap. 8.

g


in fraga lib. 2. fol. 55. p. Lobell. fol. 55.

p. lobell. fol. 6.

Gramen ischaemum  
sive dactylon plinio  
canaria Lib. 4. fol. 426  
in dact. amaro

fol. 4. pag. 7. f. 11.











ΒΟΥΠΛΕΥΡΟΝ  
BUPLEVRON, Dolorosa.

Porro See prior species est.

Plin. lib. 22. cap. 22.



Scritur nobis in Sotis.

Floret & semen profert tuis Augustiq. mensib.



CYANVS MAIOR

VERBASCI Tertium genus, THRYALLIS & LYCHNITIS, quibusdam.

Germ. Doalst Koornbloem  
 Belg. Groote Koornbloem  
 Gall. Bliet,



Seritur in Cortis, ac diu  
 perennat.  
 Floret eodem quo superiores tempore.



CYANVS MONTANVS  
seu MAIOR  
tenuiori folio.





KYANOS : CYANVS . Plin. lib. 21. cap. 8.  
FLOS FRUMENTI & BAPTISECVLA. vulg.

Ital. Fior campestre & Battiscuola.  
Gall. Beaucou, Blant sen Beant & Anbiffon, *capellucelle*  
Germ. Kornblum  
Belg. Coornbloem, En coloris  
prestantia, Blau bloem.

CYANVS ALBVS

CYANVS PURPUREVS



Ceruleus nascitur in meulis & inter segetes : reliqui duo  
seruntur in hortis.  
Florent omnes à Maio mense in Augustum usq.

Cyam quoque minoris et videtur Spec. 103 fol. 437. lib. 4.








ΛΑΓΩΠΟΥΣ  
LAGOPUS VULGARIS  
TRIFOLIUM SPECIES Cordo in annot. in disc. lib. 4. cap. 17.

Gall. τοῖς δὲ εἰσιν.  
Germ. Katzenohr &  
belg. Gatzepothens.

Gatzenpflanz.

Disc. lib. 4. cap. 15.



Nasitur temere in arvis et in segetibus.  
Flaret Iulio & Augusto mensib.











ἩΔΥΣΑΡΟΝ  
HEDYSARVM seu  
SECVRIDACA

Gall. Estrain, ou fœtur de Loup.  
Germ. Vulturant d'ye Cinsky.

Porro Hgc Maior est, seu Altera Dodonci  
eap. quam Matthioli exhibet: minus  
quam altera cum Dioscoridis  
descriptione conveniens

Diosc. lib. 3. cap. 124.  
Galen. lib. 6. simp. medic.



Nascitur alibi sponte in segetibus  
inter Corda ac lentis:  
nobis in Hortis tantum.

Floret mense Iulio Augustoque,  
semen paulo post perficit.









ac. 4. Feb. 44. *Pisum sativum* vulgatum nains fol. 76. p. 2.



PISON : PISVM

Ital. Piselli.  
Gall. Dupois  
Germ. Erbweisser  
Belg. Ervwey off Ervwey

PISVM  
ROMANVM

PISVM  
ALBVM



Coluntur maiora in Hortis, minora in arvis: satag. mense  
Martio Aprilis, maturefcunt Augusto.









KYAMOS  
FABA VVLGARIS  
PHASELVS, Dodonæo.

Ital. Fava . Gall. fève  
Germ. & Belg. Bohnen.

Finum, pingue solum & optime subactum amat.  
Colitur nobis Maior in hortis: Minor in arvis: sataq;  
mense Martio, maturefcit Augusto.











CICER ARIETINVM ALBUM.

Ital. Ceci.  
Gall. Ciroz seu Cigroz.  
Germ. kinsow seu kinsowss.  
Belg. Gysowter Ciroz.

Diosc. lib. 2. cap. 90.  
Galen. lib. 1. de alim. facult.



Seritur ab Herbaris rei Studiosis in Sortis.  
Maturescit ad modum reliquorum Leguminum,  
mense Augusto.







*Cicer silvestre mals.*  
**CICER ARIETINUM RUBRUM**  
seu **VENEREUM**  
Matthioli.



*Scritur in Hortis.*  
*Maturefcit ad modum reliquorum*  
*leguminum mense Augusto.*





LUPINVS  
Fland. vichboonen.

*Lupinus flore caruleo. lib. 4. fol. 466.*

*Lobell. fol. 99. var. 2.*







179

LUPINI LVTEI



*Alibi sponte in campestribus: apud nos in hortis  
tantum sibi proveniunt.*









*Lupinus sativus* Lb 4. fol. 466.



*Ervum sicut 48*  
*orobus lib. 4. fol. 48*  
*Dalech.*  
*Gal. Oroba*

















ΛΑΘΥΡΟΣ  
CICERCULA Columelle & Palladij, Dodon. ~~Cicer crinum~~

belg. ~~Isradu~~ ~~Isradu~~



Floret mense julio,  
maturefcitq. Augusto.

Colitur in Hortis à rei  
Herbariis studiosis.



MEDICA Ruellij, et, ut apparet,  
ONOBRYCHIS Dodonei.



Aliunt in estuarijs & maritimis locis sponte affatim nasci:  
colitur tamen in Hortis ab Herbarijs rei studiosis.  
Floret ac semen perficit mense Julio.







*Lathyrus sativus*  
*angustifolius*  
min Ball des v. r. p.



*Lathyrus sativus* L.



ΛΑΘΥΡΟΣ ΑΓΡΙΟΣ  
LATHYRVS SILVESTRIS, Dodoneo.



Nascitur sponte pingui solo, circa sepes et agrorum margines  
radice perenni. Floret mense junio, maturefcitq.  
Augusto.





FABA NIGRA  
PHASELVS SILVESTRIS

Dodonæo.

belgis Wildt. boom, Zwaart boom,  
vnde Moerkorn.







ΦΑΣΗΟΛΟΣ : PHASEOLVS  
DOLICHVS & SMILAX HORTENSIS

Siliques autem earum Græcis ΛΟΒΙΑ & ΛΟΒΟΙ  
nuncupantur.

Meminit tam SMILACIS HORTENSIS, quam PHASEOLI, lib. suo  
secundo Dioscorides diversis capitib. Quare et diversas inter se  
esse stirpes, vix dubitandum.

Ital. Fagioli  
Gall. fagiols Haricot  
Germ. Bockstoe Bonen  
Belg. Boonsstoe Boontkens.

Diosc. lib. 2. cap. 100. & cap. 140.  
Galen. lib. 1. de alim. facult.



Lactum atq; insolutum solum  
amant.

Seruntur apud nos in hortis mense Aprili,  
ubi gelare omnino cessaverit, maturescuntq;  
sub Autumnum.















ONOBRYCHIS quibusdam, aut  
APHACAE SPECIES





BIKION

VICIA : à vinciendo, vt Varroni placet, dicta.

Varro de re rustic. lib. 1. cap. 31.

Gall. rooster  
Germ. wicken  
Belg. witsta,

57




Seritur passim in arvis mense Aprili, in iumentorum  
pabulum : in tulio Augustoz maturefcens.



Viciae species potius  
GALEGA ALTERA &  
ARACHI SECIES, Dodoneo.

Gall. Woste pailnager.  
Germ. Wilder Wirtshy  
Belg. Wilder Witsky




Provenit sponte in sepib. atq. agrorum riuorumq. marginibus,  
et in pratis humidioribus.  
Floret mense Iunio, & paulo post siliulas & semen reddit.

Lab. 4. fol. 4. 7. 9

Dodon. pag. 839. dabit sine ironia.



ΑΡΑΧΟΣ ΕΤΕΡΑ  
ARACHVS ALTERA, Dodonæus.  
Belg. *Wolffs Cressen.*



*Amasatur segetibus, ut prior, magno plerumq; earum  
exitu.  
Floret mense Iunio, maturescitq; Augusto.*







ΑΦΑΚΗ  
APHACE seu APHACA Dioscoridis Dodonaeo.

Diose. lib. 2. cap. 142.  
Galen. lib. 1. de alim. facult.

Nascitur sponte in arvis opimis & inter segetes  
praesertim frumentaceas.

Floret mense Maio, semine in junio  
tuliq; maturescente.



ΟΡΟΒΑΚΧΗ : OROBANCHE Dioscoridis, alia à Theophrasti,  
que Arabum CASSYTHA est.  
RAPVM GENISTAE, Dodongo.

Diosc. lib. 2. cap. 136.  
Galen. lib. 8. simp. medic.

Ital. Herba lupa, coda di liono, o Herba tora.  
Gall. Grain de Cionne.  
Germ. Sommer-Wurzt.  
Belg. Sommerap.



Nasitur arido tenuiq; solo, sub humiliori genista,  
que rari crescit & vix aut nunquam floret:  
filamento quodam illius radicibus adherens,  
totumq; succum eius sibi in alimentum rapient.  
Reperitur autem lunio lunioq;  
mensibus.







ΓΑΛΥΞ καὶ ΓΑΛΑΞ ἢ ΓΑΛΞ  
GLAVX & GALAX Dodonæa.

Germ. Milch Kraut.  
Belg. Melckruyt.

Diosc. lib. 4. cap. 124.



Maritima & salsa amat loca, Zelandis  
familiaris.  
Floret junio julioq. mensibus.



Jull. Herbe aux laccaricos



Polygala frons-nigra, Schreb. pag. 502. part. 1.



De Polygalis i. 16. lib. 4. pag. 490. et seq.

De Polygalis i. 16. lib. 4. pag. 495.

Polygala frons-alba, Schreb. pag. 502. part. 1.



LAMII GENVS  
VERTICA LABEO, flore purp.

Belg. *Samstol* off *Samstol*.



Diosc. lib. 4. cap. 80.

Nascitur iuxta semitas & in segetibus.  
Floret mense julio.



LAMIVM      flore subulato.  
Gall. Bilia morte





ΤΗΛΙΣ & ΚΕΡΑΤΙΣ  
 ΑΙΤΟΚΕΡΟΣ καὶ ΒΟΥΚΕΡΟΣ  
 FOENVM GRAECVM &  
 SILICIA Plinio, &  
 SILIQVA Colimella, Dodonaeo.

Ital. Fienegrec.  
 Gall. Fenégrec, & Fenégre.  
 Germ. Bortfegren & Rillgryn.  
 Belg. fenegriek.

Diosc. lib. 2. cap. 94.  
 Gal. lib. 8. simp. medic.  
 Plin. lib. 18. cap. 16. & lib. 24. cap. 19.  
 Colimella de rerust. lib. 2. cap. 11.




Scritur passim in Hortis.  
 Floret mense Iulio, semenq. perficit Augusto.









belg:

voegselvout.

Gall. pie d'aspeu

Floret à mense junio in Autumnum usq:  
& interea semen perficit.

Nascitur in arvis & pratis editioribus  
& in campestribus.

VICIAE PARVAE IGNOTAE, aut forte  
APHACAE SPECIES



Nascitur eisdem fere quibus  
superior locis.








SCORPIOIDES AQUATICVM Dodonæi.

Germ. (teste Gesn. in Hortis Germ.) Würgiß mein nit.  
belg. Walstz Scorpionskraut.  
Gall. petite germandrée d'eau



Floret à mense Maio per totam  
ferè estatem.

Paßim locis palustrib. ac iuxta fossas  
provenit.

de Scorpiorde vide dal. l. 4. p. 483. l. 6. 11. p. 1353. & l. 6. 10. p. 1191.

in Dodon. 1. 3. 20. fol. 72.



ΛΙΝΟΝ  
LINVM

Ital. Lino. Gall. Lin.  
Germ. Lein & fester  
Belg. vlas.

Diosc. lib. 2. cap. 95.  
Gal. lib. 7. simp. medic.  
Plin. lib. 19. in proemio & cap. 1.



Pinguetum solum amat & aliquatenus humidum:  
verum id emacrat.  
Scribitur nobis mensis. Martio atq. April: floret  
mense Maio tumidq; et paulo post. etiam ante  
quam omne deflorent, euellitur.



*Linum silvestre secundum*





KANNABIS HMEPOS  
CANNABIS

Ital. Canape.  
Gall. Clamur.  
Germ. Zämhölz.  
Belg. hemp.

Diase. lib. 3. cap. 141.  
Galen. lib. 7. simp. medic. &  
lib. 2. de alim. facit.  
Plin. lib. 19. cap. 9. & lib. 20.  
cap. 23.

Dodonæus duas species facit,  
marem scilicet & feminam:  
verum hæc femina est.



Seritur in arvis, ubi ex eodem semine  
utroq; Sexus provenit.  
Semen autem Summè mense Julii maturascit.



LAMIUM  
flore variegato.



Nasitur eisdem quibus precedens loco, &  
Floreit eodem tempore.



ΙΣΑΤΙΣ ΗΜΕΡΟΣ  
ISATIS SATIVA & GLASTVM


Ital. Glasto et Guado.  
Gall. Ginfior ou yaspie.  
Germ. Weide oder Weide.  
Belg. Weide & Flandris (Mar).

Diosc. lib. 2. cap. 177.  
Galen. lib. 6. simp. medic.



Pinguē solum amat.  
Floret mensib. Maio Iunioq.





*Trifolium corniculatum* Pers. Lb



*Trifolium fortunei minus*






TRIFOLIUM TORTUOSUM MAIUS fructu glabro:  
 Quod MEDICAE species, à quibusdam annumeratur.  
 Nullus tamen id exhibuit.



Nascitur in arvis & pratis, inter segetes et legumina.  
 Floret mense Maio Iunioq.



TRIFOLIUM TORTUOSUM MINUS  
semine aspero.



Precedenti & conterraneum est, & coetanum.



*Melilotus alba* (L.) Scop. *Alouatta* 4. pag. 502.

Scop. pag. 565. 2.





///

Gall. ground treble





ΛΩΤΟΣ ΗΜΕΡΟΣ  
 LOTVS VRBANA seu HORTENSIS  
 TRIFOLIUM ODORATUM, Matthi  
 olo ac Dodonæo.

Ital. Tribulo sine Trifoglio odorato.  
 Gall. Trefleur odoriférant.  
 Germ. Sibth gurgel  
 Belg. Gewone gurgelkruid.



Scribitur nobis in Sortis: semelq. satum, ex semine deiecto  
 seu elapso faule regerminat.

Floret et semen profert Iulio atq. Augusto mensib.



*Trifolium bituminosum* forte Dolen.





OXITRIPHÝLLON  
Scribonij Largi, Dodongo.

Scribonij Largi, Dodongo.



Scriptur in Hortis.  
Floret in fine aetatis.





*Medicago coronata* vel *shabon* L. Gall. for 48 cl. 10. p. 2.





*Trifolium asphalenum* Coll. fol. 76. p. 2.









*Fam. burgundica* Lobell. f. c. 42. p. 2.







TRIFOLIUM PRATENSE  
CANDIDUM



TRIFOLIUM PRATENSE  
PURPUREUM



*Abundant in pratis leuiores.*

LOTUS SILVESTRIS Dodonaei.  
Belg. *Stroomclauw*



LOTUS SILVESTRIS MINOR  
Belg. *Clayn Stroomclauw*



*Nascuntur in arvis et pratis aridioribus: variamque  
sortiuntur pro loci natalis qualitate magnitudinem.*

*Florent omnia per totam fere aestatem.*

de vltroque h. u. fol. 1355



Tabernaemontana, horti & infusum potabile.



Vi. Trifolium autum. & abnormale.





*Lobelia spicata* Schlecht. altera metz. 11. 9. 1861



TRIFOLIUM MAGNI SPECIES  
*ignota nobis.*



Nascitur

Floret





*mecloti per aqua*












*Trifolium hirsutum* L. f. p. 513.







Ex  
Bibloth. Regia  
Berolinensi.







